

Nocera

Vass4R08s536-540



INRA

SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


OMtp805


Nocera


8 R 40 s. 56-60

+ R 40 s. 536-540
~~8 R 40 s. 56-60~~
Nocera









CLASSE 8 RANG 10 Souche 56-60

Désignation : Nocera

CHARGE : Année :

Vératison : 8,8

Maturité : 12.9.88

Mail : 2 Pour : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim : 18 +4

L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

TAILLE : Année :

EG - G - M - P - Dim : 18x17

Forme : sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVOUR : s - m - ar - fox - herb.

AVEC : Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

54
53
52
51
50

ANNEE 1988

NOM Nocera N

EMPLACEMENT 8 R10 156.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f	3	21.3	25.3	3	9	27.5	31.5	36	8.8	12.8	16.8	27.9
2												
3 f												
4 f	4		25.3	3								
5												
		Pourriture :		0.8.15.3	Port : enge		Vigueur : 2 faible					
				25.3			31.5			+3		
				+1			0					

ANNEE 1989

NOM Nocera

EMPLACEMENT 8 R10 156.60

4 R8 1536 540

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f	2	16.3	20.3	0	8,0				31.7	6,8 +2	16,8	11.9 +5
2												
3 f												
4 f	3	16.3	20.3	4		24.5	27.5 0	30.5				
5												
De 20.3.89 + 2												

De 20.3.89 +2

Mell. 5% Pourriture : 2 Port : enge Vigueur : 2

ANNEE 1990

NOM Noceira N

EMPLACEMENT 8 R10 A56-60

4 R8 A536.540

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	8											
3	8											
4	8											
5	4	1.3	5.3.	5	12	16.5	18.5 -2	21.5	30.7	4.8 +3	7.8	3.990 +4
		D u 5.3.90 (-4)										

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nocéré
8 R 10 s. 56-60 (s. 60)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 191 - ~~sans~~ avec villosité
laineuse 192.

Blanc 193 - fauve ou roux 194 - carminé 195 - à liséré carminé 196 -
jaune 197 - à plages bronzées ou cuivrées 198 - entièrement bronzé
ou cuivré 199 - vert 200.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 205 - ~~sans~~ avec villosité laineuse 206.

Face supérieure : clanches 207 - fauves ou rousses 208 - carminées 209 -
à liséré carminé 210 - jaune 211 - à plages bronzées ou cuivrées 212 -
entièrement bronzées ou cuivrées 213 - vertes 214 - autres 215.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 216 - sétueux 217 - velouté 218 - aranéeux 219 -
duveteux 220 - cotonneux 221 - sans villosité pubescente 222 -
sans villosité laineuse 223.

Limbe : glabre 224 - sétueux 225 - velouté 226 - aranéeux 227 -
duveteux 228 - cotonneux 229 - sans villosité pubescente 230 -
sans villosité laineuse 231.

À limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 232 - fauve ou roux 233 - carminé 234 - à liséré carminé 235 -
jaune 236 - à plages bronzées ou cuivrées 237 - entièrement bronzées ou
cuivrées 238 - verte 239.

À pétiole glabre 240 - sétueux 241 - velouté 242 - aranéeux 243 -
duveteux 244 - cotonneux 245 - sans villosité pubescente 246 - sans
villosité laineuse 247.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nocera noir
8 R 10 A.56-60 (A.60)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

À contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 248 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Méristhale : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Nœuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nocéra noir

8 R 100-56-60 (n. 60)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne *142* - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux *147* - duveteux *148* - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - ~~sans~~ ^{avec} villosité
laineuse *273*.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux *154* - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - ~~sans~~ ^{avec} villosité
laineuse *275*.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. *light*

Lobes : *plan* - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée *162* - grossièrement bullée 159 - gaufrée *160* - *afairé*
plissée au point pétiolaire *161*.

Nervures : Face supérieure : verte *163* - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte *167* - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen *171* - court 172.

Glabre *173* - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement. *light*

Coloré 176 - partiellement coloré *177* - vert *178*. *Don*

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

-Calvo87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nocéra

8 R 10 A - 56.60 (n.s)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 48 x).

Râche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 77 - mi-acuté 78 - acuté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 17 x 16).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A pas incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foixée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

DENOMINATION :

Nocera

EMPLACEMENT :

8 R 10 156. 60 x 5

(sur son fil)

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 89

N° d'ordre :

Désignation : *Nocera*

Emplacement : *8 R10 156-60*

Angle des nervures	: 1 - 2 - (3)
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L ₁ /L ₂	: 7 - (8) - (9)
L ₂ /L	: (10) - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - (33) - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V	: (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: 40 - (41)
Dents (angle)	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.):	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L ₃	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - (58) - 59
Angle des nervures L ₃ L' ₃	: (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtus - moyennes - aigües

Rennes 90